

Protocole de prise en charge des patientes enceintes en vue d'un séjour à l'hôpital

1. Dépistage systématique Covid 19 par Frottis (PCR)

Qui doit être dépisté ?

A/ Patiente asymptomatique

1/ Toute patiente se présentant en travail salle d'accouchement, en travail spontané, frottis réalisé à admission par sage femme en charge de la patiente

2/ Toute patiente prévue pour un déclenchement

frottis réalisé en consultation à 40semaines ou 48h avant par la consultation gyneco

3/ Toute patiente bénéficiant d'une césarienne programmée

frottis réalisé par la consultation gyneco , 48H avant la césarienne

4/ Toute patiente admise dans l'unité de grossesse à risque

frottis réalisé à admission par la sage femme

B/ Patiente symptomatique

Faire le frottis et réaliser un scan thoracique d'emblée.

Technique de prélèvement

Frottis viraux disponibles au bloc , à la consultation et au labo

Demandes pré remplies

S'habiller avec gants , masque chirurgical et visière

Introduire l'écouillon dans la gorge puis dans chacune des narines jusqu'à la ligne rouge

Emballer le frottis dans un papier pour les mains et le placer dans un premier sac en plastique. A l'intérieur de la pièce

mettre le frottis dans un deuxième sac présenté par une collègue et introduire la demande à l'extérieur dans la pochette .

Envoyer les frottis au labo.

Une navette est organisée 2X / jour (8H et 14H).

Résultats

Analyse du frottis à IBC chaussée de La Hulpe (Dr Delforge Marie -Luce= virologue en charge de ces analyses)

Résultats seront fournis fin de journée pour les frottis arrivés au labo avec la navette de 9H et le lendemain en matinée pour ceux arrivés au labo avec la navette de 15H.

2. Adaptation des mesures de précaution de la maternité

- port d'une visière par la sage femme et le gyneco lors de tous les accouchements.

- visite autorisée, à la maternité, pour une personne, toujours la même, asymptomatique et ce depuis plusieurs jours (anamnèse à l'entrée et température prise d'office) : 1X/jour

_ organisation d'une consultation quotidienne, de 11 à 12H, de dépistage par frottis des patientes , à 40semaines ou 48h avant une césarienne programmée et/ou un déclenchement. Celle-ci sera effectuée par les PG et/ou le gynécologue de garde le week-end, en consultation au o.

Dr Beck et Dr Tsepelidis